
FUCITHALMIC®

Gotas oculares viscosas **1, 2, 3, 4, 6**

Antibiótico oftálmico

(Ácido fusídico)

COMPOSICIÓN: SUSPENSIÓN OFTÁLMICA de ácido fusídico microcristalino al 1% en una formulación especial que permite una gradual cesión sostenida. El ácido fusídico es un antibiótico de la familia de los fucidanos, aislado del hongo *Fusidium coccineum*.

PROPIEDADES: Antibiótico para uso oftálmico. El ácido fusídico es activo frente a una amplia gama de microorganismos grampositivos, especialmente el estafilococo. Otras especies sensibles a la intensa actividad antibacteriana del ácido fusídico son el estreptococo, neumococo, *Neisseria*, *Haemophilus*, *Moraxella* y *Corynebacterium*. Es activo frente a estafilococos productores de betalactamasas y no presenta resistencia cruzada con otros antibióticos.

INDICACIONES: FUCITHALMIC® está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas oftálmicas, causadas por microorganismos sensibles al ácido fusídico.

PRECAUCIONES: No se debe utilizar con lentes de contacto.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Las preparaciones oftálmicas tópicas pueden ocasionar ligero ardor transitorio después de la aplicación.

POSOLOGÍA: Las gotas oftálmicas viscosas de FUCITHALMIC® le permiten una cómoda posología de 1 gota en cada saco conjuntival, cada 12 horas, por un periodo de 7-14 días.

PRESENTACIÓN: Tubo colapsible por 5 g.

Comercializado por:
LABORATORIOS BAGÓ S.A.